庫全書

子部



を 枝 母好四月生 有刺葉細似枸杞葉而失長又似桃葉而狭小亦薄 今古崎關西茶店山谷間亦有之其木高四五尺枝條 白色結子紅紫色附枝並而生状類五味子其核仁 甘性温微寒 無毒其果味甘酸 救飢 樹 俗名数李子生函谷川谷及巴西河東皆有 摘取其果紅紫色熟者食之 五十

一大已日日心時 樹 酸 晨改全書

酸棗樹 似豪花結食紅紫色似棗而圓小核中仁微匾名酸棗 多有之其木似棗而皮細莖多棘刺葉似棗葉微小花 金岁四月百十 入藥用味酸性平一云性微熱惡防已 玄扈先生曰當過 赦飢 爾雅謂之樲賽出河東川澤今城壘收野間 飲未紅熟時採取者食亦可 採取其賽為果食之亦可醸酒熬作燒酒

欠定四重全事 橑 樹 農政全書

椽子樹 金げにほんごって 谷有之木高二三丈葉似栗葉而大開黄花其實橡也 其殼斗可染皂 有林東自果其鼓即像斗也橡實味苦澁性微温無毒 古扈先生日食麥橡令人健行 枚飢 又日取子碾或春或磨細水淘去苦味次淘取粗 本草橡實擦木子也其殼一名行斗所在山 取子換水浸煮十五次淘去滋味蒸極熟 食之厚腸胃肥健人不飢 卷五十五

TO LITTE 栗粉不異也凡木實草根去惡味取淨粉法並同 查飼承甚克腸淘取細粉如製真粉天花粉法

クランドリノニ	V.				
7.1		-			
息五十二			·		
1					
-					
-					

これっこうられ とこう 荆]

多分四月五十 者開花作穗花色粉紅微帶紫結實大如黍粒而黃黑 义葉似麻葉而頭短又有葉似榛葉而短小却多花义 隱 訣云荆木之華葉通神見鬼精 南陽霓句山谷并眉州蜀州平壽都鄉髙岸及田野中 **告性溫無毒防風為之使惡石膏爲頭陶隱居登真** 极飢 木草有牡荆實一名小荆實俗名黃荆生河間 採子換水浸淘去苦味晒乾掐磨 為麵食 之 表五十五

大臣马巨人的 樹兒賽寶

寅稍 團紋脉微魔開淡黃白花結實似酸棗大微長 两 金グロだろ言 頭尖躺色赤既乾則皮薄味酸性平微溫無毒一 起實一名鼠矢生漢中川谷及耶那兔句東海承縣海 實事兒樹 州今鈞州密縣山谷中亦有之木髙丈餘葉似榆葉而 大熱勢實為之使惡枯梗防風防已 飢 本草名山茱萸一名蜀棗一名鷄足一 摘取實豪紅熟者食之 卷五十五 名


久已四百七十二 孝 兒 孩 頭 農政全書

數對共為一攢生則青熟則赤色味甘苦性平無毒益 薄澁枝葉間開黃花結子似溲疏兩兩切並四四相對 孩兒拳頭 金ケロルとって 檀榆之類也其皮堪為索 所出州土但云所在山谷多有之令輝縣太行山山野 亦有其木作小樹葉似木槿而薄又似杏葉頗大亦 救飢 甚美 本草名炭送一名擊送一名弄先舊不著 採子紅熟者食之又煮枝汁少加米作

た己の巨公子

農政全書

一人四月 小寺 兒 農政全書



兒果 裏山


山裏果兒 似花来葉亦團開白花結紅果大如櫻桃味甜 救飢 枝並似初生桑係上多小刺葉似菊花葉稍團 採樹熟果食之 名山裏紅又名映山紅果生新鄭縣 欽定四庫全書

狀如李子色似紫茄色味甜 葉頗長硬面厚稍作三义枝葉間生果初則青小熟大 無花果 立處先生曰子本住果第領良種宜廣植之 **救** 治病 生山野中今人家園中亦栽葉形如葡萄 採果食之 今人傳說治心痛用葉煎湯服甚効

にたいのはないかい 舎 青 條 子 農政全書

銀戶口月月 枝子葉而光俊微尖枝條間開淡粉紫花結子似枸杞 子微小生則青而後變紅熟則紫黑色味胡 青舎子僚 生密縣山谷間科條微帶柿黃色葉似胡 採摘其子紫熟者食之 卷五十五

文 足四員全書 白 棠 樹 農政全書



LA C. DOWN MAIN 뢎 拐 農政全書

姜拐义而細短深茶褐色故名拐賽味甜 多大四月全書 更尖腳面多紋脉邊有細鋸齒開淡黃花結實佚似生 教飢 生密縣梁家衙山谷中葉似楮葉而無花义却 摘取拐賽成熟者食之

久已日日公司 樹兒桃木 農政全書

積聚為 葉而狭小無花义却有細鋸齒又似青檀葉稍問另又 金月口月ろ言 開淡紫花結子似梧桐子而大熟則淡銀褐色味甜可 食 桃兒樹 飢 店狀類小桃兒極堅實故名木桃其葉似格 生中年土山間樹高五尺餘枝條上氣脉 採取其子熟者食之


圕 石

石岡橡 多定匹库全書 **櫟葉極小而薄邊有鋸齒而少花义開黃花結實如棟** -而極小味遊微苦 极飢 生汜水西茶店山谷中其木高大許葉似像 採實換水煮五七水令極熟食之 卷五十五

とかりを とき 茶 臼 八五全書 土


水茶臼 葉似大葉胡枝子葉而有尖又似黑豆葉而光厚亦尖 金罗巴尼人 開黃白花結果如杏大状似胡瓜瓣而色紅味甜酸 教飢 生密縣山谷中科條萬四五尺並上有小刺 果熟紅時摘取食之 卷五十五

一次記四事全事 野



改定四軍全書 樹 欒

採斫以為秤簳葉似木葛葉微狹而厚背頗白微毛又 多いプロアノファ 似青楊葉亦窄開淡黄花結子小如豌豆而匾生則青 樂樹 熟則紫黑色味甘 救飢 生犯水西茶店山谷中其木高大堅勁人常 摘取其實紫熟者食之 卷丘十五 袋布 駝 驢

舒定四庫全書 則色紅味群 頗齊其葉對生開花色白結子如蒙豆大兩兩並生熟 驢駝布袋 赤黄色葉似郁李子葉頗大而光又似省活油葉而尖 救飢 生鄭州沙崗間科條高四五尺枝梗微帶 採紅熟子食之 卷五十五 

Ť

農政全書

味甜 婆婆枕頭 金少口及人 櫻桃葉而長所開黃花結子如菜豆大生則青熟紅色 教飢 生釣州密縣山坡中科條萬三四尺葉似 採熟紅子食之

人已可以上的 古 樹 利 農政全書

多分四周台電 吉利子樹 八葉似野桑葉而小又似樱桃葉亦小枝葉間開五辨 失花碧玉色其心黄色結子如椒粉大两兩並生熟 其子熟時採摘食之 一名急縻子拜荒野處有之科條高五六 卷五十五


定四庫 生書 農政全書卷五十六 子部

詳校官中書 度致其 編修臣倉聖脈覆勘 總校官進士臣 校 繪 對官中書 腾 錄監生 黄臣鹄 監生 實光華 臣高

朱

鈐

中



寒根大寒子微寒無毒白色無刺者良俠西枸杞長 開小紅紫花隨便結實形如東核熟則紅色味微苦性 三五尺上有小刺春生苗葉如石榴葉而軟蓮藍葉間 甜菜子根名地骨生常山平澤今處處有之其並幹高 盧或名天精或名却老一名枸繼和 大圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如 一名仙人杖一名西王母杖一名地仙苗 一名苦杷俗呼為 名托

一銀 元四庫全書

卷五十六


祀

名祀根一名枸忌一

名地輔

一名羊乳

天已与馬公島 樱桃全少核暴乾如餅 **区是先生日常過子本勝樂葉亦嘉疏** 飲之 採葉煤熟水淘淨油鹽調食作美食皆可 子紅熟時亦可食者渴煮葉作飲以代茶 農政全書




灰色日里公馬 粨 樹

柘樹 金分口尼台電 者最佳密州側柏葉尤佳今處處有之味甘一云味甘 辛性平無毒葉味苦一云味苦辛微溫無毒牡碼及桂 瓜子為之使畏莉花羊蹄草諸石及超麵 救飢 本草有杨實生太山山谷及陝州宜州其乾州 禁新生并城者換水浸其告味初食告遊 列仙傳云赤松子食相子齒落更生採相 飢冬不寒夏不熟 人蜜或棗肉和食尤好後稍易喫選不復

之心可見 心計 樹

入湯 皂炭樹 金分四月子言 柏實為之使惡麥門冬畏空青人參告參可作外樂不 處處有之其木極有高大者葉似槐葉瘦長而尖枝間 多刺結實有三種形小者為猪牙皂莢良又有長六寸 敄 一者用之當以肥厚者為佳味辛鹹性溫有小毒 飢 生雅州川谷及魯之鄉縣懷孟產者為勝今 以子不以多少炒春去赤皮浸軟 操嫩芽煤熟换水浸洗淘淨油鹽詢食又 巻五十六

五	•	模政全書	九三日日 八十
		日普過	玄扈先生曰當過
		糖漬之可食	313-



樹 桃

档挑樹 紅色乃成熟浸洗去穰取中子入樂一云皮班者是精 利 多毛漩而有子者為佳其桃如彈大青綠色後漸變深 皮白者是殺洗可作食實味甘性寒葉味甘性 涼俱無毒 樹有二種一 種皮無花紋枝葉大相類其葉似葡萄作解义上 教飢 本草名楮實一名穀實生少室山今所在有 探索并格机带花炼糊水泛過握乾作節 焙熟食之或取樹熟猪桃紅色食之甘美 種皮有斑花紅謂之斑殺人多用皮為

|欽定四庫全書 |人 玄扈先生曰當過子花勝樂 不可久食令人骨軟


				-		
11		:		·		
II I						
I i						
					-	
		7				-
! !						
				·		
!						
1						
			-			
						-
11.	Ì					

柘 樹

發定四庫全書 燕甚小而薄色颇黄淡葉稍皆三又亦堪 飼蠶綿柘 之其木堅勁皮紋細密上多白點枝條多有刺葉比桑 柘樹 有紅蓋味甘酸葉味甘微苦柘木味甘性溫無毒 /辨似柿葉微小枝葉問結實狀如楮桃而小熟則 救 本草有柘木舊不載所出州土今北土處處有 飢 可食 採嫩葉蝶熟以水浸作成黃色換水浸去 邪 味以水淘淨油鹽調食其實紅熟甘酸 基五十六 亦 刺

交包日在書

科角军木




似初生挑葉光俊色微带黃枝間開紅白花結角似豇 木羊角科 豆角甚細而尖躺每两两角並生一處味微告酸 金グロセノ 教飢 又名羊桃一名小桃花生荒野中紫蓝葉 採城稍葉蝶熟水浸淘淨油鹽調食嫩角 亦可煤食


Carried With 青 檀

青檀樹 子如梧桐子大葉味酸澁實味甘酸 多员四月全世 《微尖稍背白而游又似白辛樹葉微小開白花結青 教飢 生中年南沙尚間其樹枝係紅細薄葉形類 **成熟亦可摘食** 採葉煤熟水浸淘去酸味油鹽調食其實 卷五十六

臘 花 梅




化 藤




花

舒定四庫全書 蛛甜 **處枝梗亦似枸杞有小刺開黃花狀類鷄形結小角兒** 齒花 團宅問亦多裁葉似枸杞子葉而小每四葉攢生 救 飢 本名錦鷄兒又名醬鞠子生山野間中州 採花煤熟油鹽詢食炒熟喫茶亦可 基五十六 歌之四東全書 樹 楸



決定四車至書 棘 馬 炭政全書



次足の単位的 槐 農政全書


槐樹芽 無毒景天為之使 有盡合夜開者名守宫槐葉細而青緑者但謂之槐其 有極萬大者爾雅云槐有數種葉大而黑者名懷槐又 功用不言有别開黃花結實似豆角狀味苦酸鹹 性寒 クログと言 救 飢 本草有槐實生河南平澤今康康有之其木 採嫩芽煤熟換水浸淘洗去苦味油鹽 玄 扈先生曰當過花性太冷亦難食 食或採槐花炒熟食之 卷丘十六 調

蔓菁煮飯也 生某云世間真味獨有二種謂槐葉煮飯 新磚瓦上陰乾更煤如是三過絕不苦凡 米煮飯食之當見曹都諫真予述其鄉先 晉人多食棍禁又棍葉枯落者亦拾取和 乙卯見趙六亨民部言食槐芽法煤熟置 食樹芽葉並宜用此法去其苦味

大三日馬在新

農政新書

さ



一次定四事全書 梨 棠 樹

色頗白開白花結棠梨如小棟子大味甘酸花葉味微 葉者有三人葉者葉邊皆有鋸齒又似女兒茶葉其葉 梨樹 救飢 今處處有之生荒野中葉似着木葉亦有團 採花煤熟食或晒乾磨麪作燒餅食亦可 晒作茶亦可其棠梨經霜熟時摘食甚美 及採嫩葉煤熟水浸淘淨油鹽調食或茶

ほうせん

卷五十六

一次足四年公時 花 ી

一瓣中有子二十餘顆如肥皂角子子中新如栗子味微 文冠花 淡又似米麪味甘可食其花味甜其葉味苦 金グロアノブ 大許兼似榆樹葉而狹小又似山茱萸葉亦細短開花 救飢 似藤花而色白穗長四五寸結實狀似枳殼而三 **生鄭州南荒野間陝西人呼為崖木瓜樹髙** 食 去苦味亦用油鹽調食及摘實取子煮熟 採花燃熟油鹽調食或採葉煤熟水浸淘 患五十六

National Aires				玄尾出
				先生日
				当過
農政全苗				丁本嘉果花
7				玄扈先生曰皆過子本嘉果花甚多可食

胡穴四周五章

大田のかんはか



農政全書

Ŧ

桑椹樹 用殺人味甘性寒無毒製造忌鐵器及鈴葉极者名鷄 金ワロトとで 桑最堪入藥續斷麻子桂心為之使桑椹味甘性暖或 在於椹桑根白皮東 行根益住肥白者良出土者不可 有之其葉飼蚕結實為桑椹有黑白二種桑之精英盡 云木白皮亦可用 飢 本草有桑根白皮舊不載所出州土今處處 採桑堪熟者食之或敖成膏攤於桑葉 晒乾搖作餅权藏或直取椹子晒乾可藏 惠五十六


尼日耳白雪 皮炒乾磨髮可食 成酒其色味似葡萄酒甚佳亦可熬燒酒 可藏經年味力愈佳其葉嫩老皆可煤食 經年及取椹子清汁置板中封三二日即 農政全書

毎分四見る電

欠包四年公告 樹 榆 農政全書

榆錢樹 金グロたとこ 處處有之其木萬大春時未生葉其枝條間先生榆英 萸葉而長尖艄潤澤榆皮味甘性平無毒 形状似錢而薄小色白俗呼為榆錢後方生葉似山茱 敄 飢 本草有榆皮一名零榆生顏川山谷秦州今 採肥嫩榆葉煤熟水浸淘净油鹽調食其 乾備用或為醫皆可食榆皮刮去其上乾 燥皴漩者取中間軟嫩皮對碎晒乾炒焙 榆錢煮糜羹食佳但令人多睡或焯過晒 卷五十六

3-1	 i					1
炎定四軍全書			,			
草			-			
4						
				T	39	La
				不飢根皮亦可搖磨為髮食	产以	
				根	食	搗
炭 改全者				皮	又	磨
全書				小可	五岭	為無
				摅	皮	拌
				磨	與	糠
				為無	櫃店	麧
'				食	為	早
=					末	水
于四					澤易食又云榆皮與檀皮為末服之令人	極乾據磨為類拌糠點草末蒸食取其恐
					之人	取
					イマー人	八四



大臣日尾在

笋食所最贵者亦不聞入藥用淡行內薄節問有粉南 如霜作笛者有一種亦不名懂竹告竹亦有二種 浙近地亦時有之內厚而葉長潤淨味微苦俗呼甜苦 載所出州土今處處有之份之類甚多而入藥者惟此 以燒竹瀝者醫家只用此一品又有一 種人多不能盡別筆行堅而促節體圓而質勁成白 江西及閩中本極麗大笋味甚苦不可噉一種出江 本草竹葉有筆竹葉苦竹葉淡竹葉本經並不 種薄殼者名

金人口人

卷五十六


田江東乃有花而無實而頃来班班有實状如小麥堪 凡取竹瀝惟用淡竹苦竹簟竹爾陶隱居云竹實出藍 甘 **へこう…** 可為飯圖經云竹笋味甘無毒又云寒 竹葉最勝又有實中竹篁竹並以笋為佳於樂無用 救飢 1125 尤好 採竹嫩笋煤熟油鹽調食焯過晒乾煤食 農政全書 子六

銀灰四扇全書 農政全書卷五十六

大足四年六島 欽定四庫全書 農政全書卷五十七 豌 野 荒政採周憲王救荒本草 米穀部質可食 886 HEER 農政全書 明 徐光啓 撰


野豌豆 毎ら正是台引 粉紫花結角似家豌豆角但秕小味苦 苗長二尺餘葉似胡豆葉稍大又似首宿葉亦大開淡 救飢 生田野中的初就地拖秧而生後分生並又 採角煮食或收取豆煮食或磨麵製造食 月與家丘同


钦定四庫全書 豆 磱




扁 直 山

山扁豆 匾角兒味甜 根兼比首精兼颇長又似初生或豆葉開黃花結小 教飢 生田野中小科苗高一尺許葉似葉梨葉微 採嫩角煤食其豆熟時投取豆煮食





決定四軍全書 胡 豆



豆

蚕




次定日東台島



並兼稍問開白花結短角其豆如豇豆而小色赤味甜 兼狀類黑豆葉而團長光澤紋脉堅直色似豌豆頗白 金グログスコー 救飢 今處處有之生田園中科苗高二尺許並方其 採豆煮食炒食亦可 卷五十七

文色四重在曲 豆 農政全書



改起四重全与 齿

廿平性寒無毒 色紅葉似杏葉而軟微解開小白花結實作二小朔味 蕎麥苗 自グロルと言 赦飢 處處種之苗萬二三尺許就地科又生其茲 煮作飯食或磨為麵作餅蒸食皆可 **蒸使氣館海於烈日中晒今口開春取,** 採出業煤熟油鹽調食多食微寫其麥或


祀 御

御米花 競中有米數千粒似葶藶子色白隔年種則住米味甘 花人開四鄉紅白花亦有千葉花者結穀似能音節頭 性平無毒 子處處有之苗髙一二尺葉似靛葉色而大邊皺多有 玄扈先生曰常過嘉疏嘉實不必枚荒 救飢 本草名點子栗一名象穀一名米囊一名囊 作餅皆可食其米和竹瀝煮粥食之皆美 採嫩葉煤熟油鹽調食取米作粥或與麵 老五十七 次足四華 At 赤 豆 農政全書

體重 苗萬一二尺葉似豇豆葉微團解開花似豇豆花微小 大角之皮角微白带紅其豆有赤白黧色三種味甘酸 淡銀褐色有腐氣人故亦呼為腐婢結角比裝豆角頗 金グロルスコー 平無毒合鮓食成消渴為醬合鮓食成口瘡人食則 极飢 本草舊云江淮間多種時今北土亦多有之 角亦可煮食又法赤小豆一升牛炒大黄 採城葉煤熟水淘洗淨油鹽調食明目豆 卷五十七

交包里在


農政全書



改定四車全書 苗 農政全書

而邊皆有又牙鋸齒每八九葉攢生一處又似荆葉而 微寒滑利無毒入土者損人畏牡蠣白被惡茯苓 灰色深青開淡黃白花結實小如菜豆類而屬圖經 其皮以為布苗高四五尺莖有細線楞葉形狀似柳葉 麻黄此麻上花勃勃者味辛性平有毒麻子味甘性 母生太山川谷今皆處處有之人家園圃中多種之績 山絲苗 飢 本草有麻黃着一名麻勃一名夢幸 嫩葉蝶熟換水浸去邪惡氣味再以水 ł 名麻 云

文色 日本人社会					
Compress !				動	淘
				動風子可炒食亦可打油用	洗净油鹽
农政全書				食亦可如	調食不可
				和油用	多食亦
<u>±</u>		·			淘洗净油鹽調食不可多食亦不可久食




人門可見 红地 凿 油

大寒 子味廿微苦生則性大寒無毒炒熟則性熱壓窄為油 金方四月分言 禁問開白花結四稜鞘兒每朔中有子四五十餘粒其 油子苗 **令處處有之人家園圃中多種苗髙三四尺莝方窊面** 楞對節分生枝人葉類私子葉而長失艄邊多花人 救飢 本草有白油麻俗名脂麻舊不著所出州 子亦可炒熟食或쵗食及笮為油食皆可 採嫩苗葉煤熟水浸淘洗淨油鹽調食其

| 改定四五全等

苗 且 黄



展政全高


İ

葉似黑豆葉而大結角比黑豆葉角稍肥大其葉味甘 黄豆苗 赦飢 **令處處有之人家田園中多種苗髙一** 採城苗葉煤熟水浸淘淨油鹽調食或採 角煮食或以豆煮食及磨為麵食皆可

|決定四華全書 出 豆 農政全書

様故以名之味甜微淡 刀豆苗 金グロルスコー 4肥大開淡粉紅花結角如皂角狀而長其形似層刀 救飢 處處有之人家園籬邊多種之苗葉似豇豆 亦可 採嫩苗葉煤熟水浸淘淨油鹽調食豆角 嫩時煮食豆熟之時权豆煮食或磨麪食 巷五十七


苗豆兒眉




4

装豆葉而肥大濶厚潤澤光俊毎三葉攢生一處開淡 眉兒豆苗 白眉故名味甜 粉紫花結區角每角有豆止三四顆其豆色黑區而皆 **玄扈先生曰南名匾豆種類甚多植其佳者** 救飢 採嫩苗葉煤食豆角嫩時採角煮食豆成 熟時打取豆食 人家園園中種之安他果切蔓而生葉似 老五十十 रिकारी विकास


齿豆 豇紫



農政全書



沙定四事全替 人 畓



欽定四車全書 人 苗 ĒT, 豆

豇豆苗 長五七寸其豆味甘 亦延離落葉似赤小豆葉而極長簡開淡紫粉花結角 救飢 **令處處有之人家田園多種就地拖秧而生** 採嫩葉烘熟水浸淘淨油鹽調食及採城 角煤熟食亦可其豆成熟時打取豆食 巷五十七



處居中 山黑豆 紅花結角比家黑豆角極瘦小其豆亦極細小味微苦 自りせんだっ 救飢 大葉如菜豆葉傍兩葉似黑豆葉微圓開小 生密縣山野中苗似家黑豆每三葉攢生 **苗葉嫩時採取蝶熟水淘去苦味油鹽調** 食結角時採角者食或打取豆食皆可 巷丘十七 大田可見公子

金罗巴屋台書 有之科尚髙五尺餘葉似灰菜葉而大微帶紅色莖亦 灰青色味甜 農政全書卷五十七 可為壮扶其中心葉甚紅葉間出穗結子如栗米 俗名紅落梨生田野及人家舊庄窠 **子可磨麵做燒餅蒸食** ,城苗葉晒乾揉豬去灰煤熟油鹽調食